

CUIDADOS AO DOENTE

- └ Fornecer informações claras e precisas ao doente. Pedir-lhes para nos informarem se têm qualquer sintoma de COVID-19 ou se residem com alguém que tenha.
- └ Fazer a triagem aos doentes à entrada do departamento (avaliar temperatura e questionar sobre sintomas de COVID-19).
- └ Se os doentes não tiverem sintomas podem usar as suas próprias máscaras de proteção.
- └ Não permitir a entrada de acompanhantes a não ser que seja estritamente necessário.




RTT WORKFLOW

- └ Os tratamentos a doentes suspeitos ou confirmados com COVID-19, devem ser feitos num acelerador dedicado e com acesso distinto dos restantes. Caso não seja possível, os doentes devem ser tratados no fim do dia.
- └ RTTs devem ser separados em equipas, sem cruzamento de membros entre elas.
- └ RTTs devem usar máscaras e seguir as regras de higienização das mãos para posicionarem os doentes.
- └ No tratamento de doentes suspeitos ou confirmados, deve ser utilizado EPI total seguindo as recomendações nacionais (DGS) ou da OMS.
- └ Deve ser feita uma rigorosa higienização das mãos antes e após remover qualquer tipo de EPI.

TELETRABALHO

- └ RTTs dedicados ao planeamento devem, sempre que possível, realizar teletrabalho.
- └ RTTs de backup, em unidade ou simulação, devem trabalhar a partir de casa para realização de tarefas administrativas, com acesso remoto ao sistema de registo e verificação.
- └ Consultas de avaliação clínica e follow up realizadas por RTTs, devem ser feitas telefonicamente ou através de reuniões virtuais em consenso com o Radioncologista.
- └ Reuniões de trabalho devem ocorrer online entre RTTs em teletrabalho e RTTs em atividade clínica.



BOAS PRÁTICAS EM RT

- └ Reduzir ao máximo, os profissionais em cada acelerador e simulação (pelo menos 2 RTTs). O contacto com o doente deve ser minimizado.
- └ Nas consolas de tratamento deve ser colocada uma placa de acrílico para conversação entre RTTs e doentes.
- └ Limpeza especializada é requerida após tratamento de doentes suspeitos ou confirmados com COVID-19.
- └ Pessoal adicional na tomada de decisões em IGRT online (RTT especialista ou RO) devem visualizar/aprovar imagens numa estação remota.
- └ Devem ser utilizados protocolos de verificação offline validados (pe. e-NAL), quando a verificação diária não for possível, por forma a garantir a cobertura de incertezas adequada.